

Monthly Bulletin

National Agromet Centre

Pakistan Meteorological Department



Vol: 01-2021

JANUARY, 2021

Highlights...

- ❖ Normal to below normal rainfall reported from most of the agricultural plains of the country except GB/Kashmir, northeastern Punjab and Sindh.
- ❖ Thermal regime in this month remained mostly normal to cooler in most of the agricultural plains of the country.
- ❖ ETo remained below normal in most of the agricultural plains of the country except Quetta and Khanpur where it observed higher.
- ❖ R.H remained normal to below normal in most of the agricultural plains of the country except in Rawalpindi and Lahore where it has been recorded above normal during the month.
- ❖ Agricultural soils showed cooler trend in the major agricultural areas of the country.
- ❖ Picking/harvesting/crushing of sugarcane, seasonal vegetables and fruit orchids especially citrus and apple were the major field activities in most of the agricultural plains of the country during the month.
- ❖ Farmers are advised to protect standing crops from excess of weeds growth and other diseases.
- ❖ Necessary action may be taken in time to keep normal growth of the crops.
- ❖ The outlook for the month of February 2021 shows that nearly normal rainfall is expected in most of the agricultural plains of the country. However, northwestern Baluchistan, northern Punjab, Kashmir and upper KP may receive considerably below normal rains.
- ❖ Besides, a gradual increase in temperatures is predicted during the month.

Contents


Explanatory Note	Pg. 2
Rainfall Departure Maps	Pg.3
Minimum Temperature Graphs	Pg. 4
Evapotranspiration Graphs	Pg. 5
Crop Report	Pg. 4
Moisture Regime	Pg. 5
Temperature Regime	Pg. 7
Solar & Wind Regime	Pg. 9
Cumulative Maps	Pg. 10
Expected Weather	Pg. 12
Monthly Weather Outlook	Pg. 14
Farmer's advisory In Urdu	Pg. 15
Wheat Crop And weather (Urdu)	Pg. 16

Patron-in-Chief: **Mr. Muhammad Riaz**, Director General
 Editor-in-Chief: **Ms Asma Jawad Hashmi**, Deputy Director
 Editor: **Dr. Dildar Hussain Kazmi**, Meteorologist
 Published by: **National Agromet Center (NAMC)**
 P.O.Box:1214, Sector: H-8/2, Islamabad, Pakistan


EXPLANATORY NOTE













1. This Agrometeorological bulletin is prepared on the basis of data from 15 stations of Pakistan Meteorological Department (PMD). These stations, selected in consultation with the agricultural authorities, represent major agricultural areas of the country. There are still important agricultural areas which are not represented by the stations included in the bulletin. This may be (a) because there are no PMD stations in these areas and /or (b) the fact that we had to limit the number of stations due to the requirement of speedy data communication and processing (both of which are important for producing and dispatching timely Agrometeorological bulletins).
2. Due to the above, all inferences and conclusions hold true primarily for the above areas and not for Pakistan territory which include areas that may not be very important from the agricultural point of view and the climate of which may not bear directly on agriculture in the major producing areas.
3. The normally expected weather of next month is prepared on the basis of premise of normal or near normal weather prevailing during the coming month. As such it should not be confused with synoptic weather of the next month.
4. Summer Season/ Kharif remains from April/May to October/November and Rabi season from November to April. Mean Daily Maximum Temperature images are included in summer and Mean Minimum Temperature images are included in winter in the Bulletin.
5. In the tables, the values in the parentheses are based on 1981 to 2010 normal. Normal values (in parenthesis) of Soil Temperatures are based upon 10 years data. Dotted line (---) means missing data. Solar radiation intensities are computed from sunshine duration using coefficients developed by Pakistan Meteorological Department.













Rainfall Departure from Normal (mm) during January, 2021



Minimum Temperature (°C) during January, 2021



Minimum Temperature ($^{\circ}\text{C}$) during Rabi Season (October-April)**Dotted Curve:** Current Season (January-2021) in $^{\circ}\text{C}$ **Smooth Curve:** Normal values of Rabi Season

Evapotranspiration (mm/day) during Rabi Season (October-April)**Dotted Curve:** Current Season (January-2021)**Smooth Curve:** Normal values of Rabi Season

Crop Report during January, 2021

Picking/harvesting/crushing of sugarcane, seasonal vegetables and fruit especially citrus and apple were the major field activities in most of the agricultural plains of the country during the month. Irrigation as per requirement and availability was provided.

In **Punjab:** The growth and development of the crops both in rainfed and irrigated areas has reported satisfactory. Recent rains would have improved this situation in rainfed areas. Wheat crop is reported at Tillering/Shooting stages. Growth and development of Gram crop has been reported satisfactory and the early sown crop is attaining flowering stage. The growth of oilseed crops including Brassica (Sarson) is reported satisfactory and the crop is at pod formation while the mid and late sown crop is at flowering stage. Sowing of Masoor crop has been completed. Germination/growth of the crop is reported satisfactory. Harvesting/picking of winter vegetables and fruit (citrus) is in progress and good yield has been obtained.

In **Sindh:** Condition of wheat crop is reported satisfactory particularly in the irrigated plains. The crop is at heading/ flowering stage. Condition of oil seed crops is reported satisfactory. Castor oil and Jatropha crops are growing satisfactory at capsule formation stage. Rape Mustard is at pod formation stage, Safflower and Linseed are at vegetative stage and sunflower at early germination stage. Crushing of sugarcane is in full swing and good yield is expected. Seasonal fruits like Guava, banana, Cheeko are in good condition. Cheeko and Apple Stone (Bare) are at fruit formation stage. Picking/harvesting of winter vegetables is in progress and good yield expected.

In **Khyber Pakhtunkhwa:** The growth and development of the crops are reported satisfactory particularly in the irrigated plains. The condition of wheat crop is reported satisfactory and it is at shooting/heading stage. The harvesting/crushing of sugarcane is in progress and very yield expected. The growth of oil seed crops including newly introduced biofuel crop Jatropha is reported satisfactory. Harvesting of winter vegetables is in progress and these are available in the market. Growth of orchids is satisfactory and good yield of citrus has been reported.

In **Baluchistan:** Condition of standing crops and orchards is reported satisfactory. All varieties of apples are growing well and picking of the fruit is in progress. Yield of winter vegetables are reported satisfactory and these are available in the market.


In **Gilgit-Baltistan:** Most of the agricultural activities suspended during the extreme winter season in the area.

Moisture Regime during January, 2021


Normally January is a rainy month in winter season in the agricultural plains of the country. During this month normal to below normal rainfall reported from most of the agricultural plains of the country except GB/Kashmir, northeastern Punjab and Sindh.

The highest amount of rainfall was reported as 131 mm from Garri Dopatta followed by 120 mm at Kotli and 110 mm at Muzaffarabad.

Number of rainy days recorded in agricultural plains of the country reached up to 07 days. Maximum number of rainy days were recorded as 07 days at Muzaffarabad & Rawalakot followed by 05 days in Rawalpindi and Jhelum each.




Comparison of Actual Precipitation (mm) during January, 2021 with Normal values for Major Agricultural plains of the Country



Precipitation (mm) & ETo (mm) during January, 2021 for Major Agricultural plains of the Country


The evaporative demand of the atmosphere represented by reference crop evapotranspiration (ET_o) remained below normal in most of the agricultural plains of the country except Quetta and Khanpur where it observed higher. The highest value of ET_o was estimated in Tandojam.



The mean daily Relative Humidity (R.H) remained normal to below normal in most of the agricultural plains of the country except in Rawalpindi and Lahore where it has been recorded above normal during the month.

Maximum value of mean Relative humidity was observed as 74% at Lahore and Jhelum each followed by 72% at Faisalabad. The minimum value was observed 37% at Quetta in this month.

Maximum numbers of days with mean R.H greater or equal to 80% was observed for 13 days at Lahore and Faisalabad followed by 12 days at Sargodha and Jhelum each.




From overall analysis of atmosphere and soil, it is evident that fair moisture remained available in the air during this month. Due to which moisture condition observed as satisfactory for Rabi crops particularly in rainfed areas as well as irrigated agricultural plains of the country.

Temperature Regime during January, 2021


Temperature plays vital role in the growth and development of crops. Thermal regime in this month remained mostly normal to cooler in most of the agricultural plains of the country.

Mean daily temperature remained normal to above normal by 1-2°C in most of the agricultural plains of the country. Mean daily temperature ranged 12 to 13°C in Khyber Pakhtunkhwa, 12 to 14°C in Potohar plateau, in remaining parts of Punjab it ranged between 11 to 14°C, 13 to 15°C in Sindh, -5 to 3°C in Gilgit Baltistan region and it was observed 8°C in the high elevated agricultural plains of Baluchistan represented by Quetta valley.

Number of stress days with minimum temperature less than or equal to 0°C were observed throughout the month in Skardu and Gilgit as 31 days followed by Quetta valley for 25 days. Number of stress days with maximum temperature greater or equal to 30°C or 40°C and R.H. less than or equal to 30% was not observed in the country during this month.





The night time temperature represented by mean minimum remained nearly normal in most of the agricultural plains of Punjab and lower KP during the month. However, it remained above normal in northern Baluchistan while below normal in upper KP, GB, and Sindh. The lowest minimum temperature was recorded as -10.5°C at Skardu.



Agricultural soils showed cooler trend in the major agricultural areas of the country.

At shallow as well as deeper layers the soil temperature remained below normal in Potohar region represented by Rawalpindi, Lower Sindh represented by Tandojam, Central Punjab represented by Faisalabad and Northern Baluchistan represented by Quetta Valley. Whereas, at intermediate layers it remained nearly normal in all these regions except lower Sindh and northern Baluchistan.





From the general analysis of soil behavior in this month, it is concluded that moisture has satisfactory status in the irrigated as well as rainfed areas in upper and central parts of the country. Thus in major agricultural areas, the situation of soil moisture is satisfactory. Further rains in coming months are needed and may improve soil moisture condition during coming months in rainfed as well as irrigated areas.

Solar Radiation and Wind Regime during January, 2021


Total bright sunshine hours and solar radiation intensity remained nearly normal to below normal in KP, Punjab and Sindh. While, in northern Baluchistan and GB it remained higher. above normal in most of the agricultural plains of the country except in GB where it was observed below normal.

Mean wind speed in the major agricultural plains of the country reached up to 3 km/h with North to North-West trend. However, in northern Baluchistan it has been observed as 5 km/h.




Cumulative Rainfall, ETo and Water Stress for Rabi Season (October to January-2021)


Cumulative Rainfall (mm)



Cumulative ETo (mm/day)



Cumulative Water Stress (rain-ETo)



Normally Expected Weather during February, 2021

Westerly waves would continue to move along the middle latitudes and their troughs are expected to extend southward occasionally affecting country's agricultural plains. A normal precipitation ranges from 50 to 75 mm over Potohar plateau, 30 mm to 50 mm in Khyber Pakhtunkhwa, Quetta valley and central Punjab. Less than 10 mm rainfall is expected in southern Punjab, Sindh and lower Baluchistan.

Evaporative demand of the atmosphere is not likely to change significantly relative to January. According to the average conditions, it is expected to remain 2 to 3 mm/day in Punjab and Khyber Pakhtunkhwa. In Quetta valley it will vary from 1 to 2 mm/day; while its maxima will be observed in Sindh where it may reach 4 mm/day. The probability of occurrence of rainfall over Potohar plains is given below:-

Amount/ Day	PERCENTAGE PROBABILITY OF OCCURANCE OF DIFFERENT AMOUNTS OF RAINFALL IN FEBUARY					
	1-5	6-10	11-16	17-20	21-25	26-28
10 mm	21	22	38	40	42	29
20 mm	13	18	32	30	34	21
30 mm	6	8	21	13	17	12

The days and night, during February may be slightly warmer than January. The maximum temperature in Punjab and Khyber Pakhtunkhwa are likely to range between 19 to 24°C, 25 to 28°C in Sindh and lower Baluchistan. Quetta valley will have average day temperatures around 13°C. The minimum temperature may vary from 5 to 9°C in Punjab and Khyber Pakhtunkhwa. Slightly higher minimum would be experienced in lower Baluchistan and Sindh varying from 10 to 13°C. In Quetta valley, monthly average of minima will be around 0°C. The frequency of occurrence of freezing nights will be higher in Quetta followed by mountainous and sub mountainous plains of Khyber Pakhtunkhwa and Punjab.


The photo period during February is expected to vary between 6 hours in the north and 9 hours in the South following more or less uniformly increasing trend from north to south. Accordingly, the solar radiation intensity would also be higher in South as compared to north. It would range from 12 to 16 MJ/M²/day. Wind speed at low elevation plains may remain less than 7 km/hr whereas at higher elevation it may be slightly higher. Westerly component will remain more prevalent.

The monthly water requirement of wheat crop during February is given below:

S. No.	Region	Water Requirement	
		(mm)	Cubic Meter/Hectare
1.	Quetta valley	20-25	200-250
2.	Potohar plateau and upper KPK	30-35	300-350
3.	Central Punjab and lower KPK	35-40	350 -400
4.	Southern Punjab	40-45	400-450
5.	Sindh and lower Baluchistan	45-55	450-550

Monthly Weather Outlook for February, 2021

The outlook for the month of February 2021 shows that nearly normal rainfall is expected in most of the agricultural plains of the country. However, northwestern Baluchistan, northern Punjab, Kashmir and upper KP may receive considerably below normal rains. Besides, a gradual increase in temperatures is predicted during the month.



Research Findings of AgMIP Pakistan, University of Agriculture, Faisalabad

1. There would be significant increase in temperature i.e., 2.8°C in day and 2.2°C in the night during mid-century (2040-2069)
2. There would be significant variability in rainfall patterns (about 25% increase in summer & 12% decrease in winter during 2040-2069)
3. Climate Change will affect the crop yields negatively (about 17% for rice and 14 % for wheat)
4. If there will be no adaptation to Climate Change, majority of farmers would be the economic losers
5. With Adaptation to Climate Change (through technology and management), there would be significant decrease in poverty and improvement in the livelihood of farming community.

(Agricultural Model Inter-comparison and Improvement Project (AgMIP)

Pakistan 2012-2014)

- 1- سال 2040-69 کے دوران درجہ حرارت میں قابل ذکر اضافہ ہو سکتا ہے۔ جو کہ دن کے وقت 2.8°C اور رات کو 2.2°C تک ہوگا۔
- 2- گرمیوں کی بارش میں 25 فیصد اضافہ اور سردیوں کی بارش میں 12 فیصد تک کمی کا امکان ہے۔
- 3- مندرجہ بالا موسمی تغیرات کی وجہ سے دھان کی پیداوار میں 17 فیصد اور گندم کی پیداوار میں 14 فیصد تک کمی ہو سکتی ہے۔
- 4- اگر موسمی تغیرات کا مناسب بندوبست نہ کیا گیا۔ تو کسانوں کی اکثریت کو معاشی نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔
- 5- موسمی تغیرات کے سدباب (بذریعہ نئی ٹیکنالوجی کا استعمال اور بہتر نظم و نسق) سے غربت میں کمی اور کسانوں کی زندگی میں خوشحالی لائی جاسکتی ہے۔

(ایگمپ پاکستان 2012-2014)

فروری 2021ء میں کاشتکاروں کے لیے زرعی مشورے

ماہ فروری میں ملک کے زیادہ تر زرعی میدانوں میں معمول سے کم بارشیں ہوئیں۔ ماہ فروری میں ملک کے کچھ حصوں میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری ہونے کی توقع ہے جو کھیتی کی فصلوں خصوصاً گندم کی فصل کے لیے نہایت ہی مفید ثابت ہوں گی۔ کسان حضرات سے گزارش ہے کہ کھیتوں کے گرد حفاظتی پٹے مضبوط کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ نمی زمین میں محفوظ ہو سکے۔ ماہ فروری میں دہجہ حرارت بتدریج بڑھیں گے تاہم بلند پودے زرعی میدانوں میں برف اور بارش کی وجہ سے دہجہ حرارت نقطہ انجماد سے گر سکتا ہے۔ اس لیے اس ماہ کے دوران کسان حضرات سے مندرجہ ذیل نگارشات کو ملحوظ خاطر رکھنے کی گزارش ہے۔

۱۔ مخصوص علاقوں میں فصل کو کورے کے مضرات سے بچانے کے لیے کورہ پڑنے والی متوقع راتوں میں کھیتوں میں ہلکی آبی پاشی کرنے سے کھیت کا دہجہ حرارت فوراً یا اچانک کم نہیں ہوتا بلکہ آہستہ آہستہ کم ہوتا ہے اور اس دوران پودے کورے کے خلاف مقابلہ کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تاکہ علاوہ کورے سے بچاؤ کے لیے پودوں پر بنائی گئی نگلیوں کی جھونپڑی کو دن کے وقت سورج کی سمت کھول دینا چاہئے تاکہ سورج کی روشنی پودوں کو پہنچتی رہے۔

۲۔ فصل میں جڑی بوٹیوں کی موجودگی پیداوار میں کمی کے علاوہ دیگر منفی اثرات کا باعث بھی بنتی ہے لہذا اچھی پیداوار حاصل کرنے کے لیے ان جڑی بوٹیوں کی تلفی کے لیے فصل پر زہر کا فوراً سپرے کریں۔ تیز ہوا، جھندیا بارش کی صورت میں سپرے ہرگز نہ کریں اور محکمہ زراعت کے مشورے پر عمل کریں۔

۳۔ دودھ دینے والے جانوروں اور ان کے بچوں کیلئے سردی کی شدت سے بچاؤ کے لیے مناسب انتظامات نہ ہونے کی صورت میں بچنے والی سردی بہت نقصان دہ ثابت ہوتی ہے اور اس سے متاثر ہونے والے جانوروں کی دودھ کی پیداوار بہت کم ہو جاتی ہے جبکہ ان کے بچے بعض اوقات زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اس لیے ضروری ہے کہ انہیں رات کی سردی اور خشک ہواؤں سے محفوظ رکھا جائے۔ مرغیوں کے اندر سے اور گوشت کی پیداوار بھی سردی کی شدت کی وجہ سے بری طرح متاثر ہوتی ہے اس نقصان سے بچنے کیلئے ضروری ہے کہ جانوروں کے شیلڈ مناسب دہجہ حرارت تک گرم رکھے جائیں۔

۴۔ ماہ فروری جیسے جیسے اختتام کی جانب بڑھے گا دہجہ حرارت میں اضافہ ہوتا جائے گا اس کے ساتھ فصلوں کی نشوونما بھی تیز ہو جائے گی۔ گندم کی فصل سٹاکاٹے کے مرحلہ پر پہنچ رہی ہوگی۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں پانی کی کمی فصل کی پیداوار کو بری طرح متاثر کرتی ہے اس لیے ضروری ہے کہ آپ اس دورانیے میں فصل کا اچھی طرح سیراب کریں۔ موسمی حالات سے متعلق مزید معلومات کیلئے محکمہ موسمیات کے تقریبی دفتر سے رابطہ کیا جاسکتا ہے۔ جن کا پتہ درج ذیل ہے۔

۱۔ نیشنل ایگرو میٹ سینٹر پی۔ ایو۔ یکس نمبر 1214 ہیکٹر ایچ ایٹ نو، اسلام آباد۔ فون نمبر: 051-9250299

۲۔ نیشنل فورکاسٹنگ سینٹر برائے زراعت، پی۔ ایو۔ یکس، 1214 ہیکٹر ایچ ایٹ نو، اسلام آباد۔ فون نمبر: 051-9250363-4

۳۔ ریجنل ایگرو میٹ سینٹر ہنزوا رانی، یونیورسٹی، مری روڈ، راولپنڈی۔ فون نمبر: 051-9292149

۴۔ ریجنل ایگرو میٹ سینٹر، ایوب ریسرچ انسٹیٹیوٹ، جھنگ روڈ، فیصل آباد۔ فون نمبر: 041-9201803

۵۔ ریجنل ایگرو میٹ سینٹر، ایگریکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ، ٹنڈو جام۔ فون نمبر: 022-9250558

۶۔ ریجنل ایگرو میٹ سینٹر، ایگریکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ، سراب روڈ، کوئٹہ۔ فون نمبر: 081-9211211

تفصیلی موسمی معلومات کیلئے محکمہ موسمیات کی ویب www.pmd.gov.pk ملاحظہ کریں۔

گندم کی پیداوار پر بشمول موسم اثر انداز ہونے والے اہم عوامل

(1) تعارف:

گندم پاکستان میں موسم سرما (ربیع) کی سب سے اہم فصل ہے۔ جس کی 80 فیصد کاشت اور پیداوار پنجاب، تقریباً 15 فیصد سندھ اور باقی خیر بختو، ننواہ اور بلوچستان میں ہوتی ہے۔ گندم پاکستان کے کثرتی آبادی کی خوراک کا لازمی جز ہے۔ پاکستان میں گندم کی اوسط فی ایکڑ پیداوار تقریباً 1.5 ٹن/ہیکٹر کے مقابلے میں آج بھی ہے جبکہ پاکستان میں اگائے جانے والے پتوں سے حاصل ہونے والی کی زیادہ سے زیادہ پیداوار اوسط حاصل ہونے والی پیداوار کا صرف ایک (Potencial yield) کے مقابلے میں ایک چوتھائی ہے۔

(2) پاکستان میں گندم کے پیداوار میں کمی کی بنیادی وجوہات:

پاکستان میں اوسط فی ایکڑ پیداوار میں کمی کی بنیادی وجوہات میں غیر معیاری بیج کی کاشت دیر سے کاشت، کمیادی کھادوں کے بہت زیادہ منجھے ہوئے کیچہ سے ان کا ضرورت سے کم استعمال، موسمیاتی تبدیلی اور ہر سال بارش کا اتنا رچھاؤ زراعت میں دیگر زرعی ٹیکنالوجی کا کم استعمال، ایک ہی زمین پر بار بار گندم کا اگاؤ، اور فصل میں موجود زائد جڑی بوٹیوں کی بہتات وغیرہ شامل ہیں۔ سلسلے ہر سال پیداوار میں اتنا رچھاؤ سے پورے ملک کی آبادی متاثر ہو جاتی ہے پچھلے تین اچا رسال سے پاکستان میں گندم کی کل پیداوار ملکی ضرورت سے زیادہ رہی ہے۔ 2011ء میں گندم کی کل پیداوار تقریباً 24 لاکھ ٹن رہی جو کہ ملکی ضروریات سے زیادہ (3 سے 4 لاکھ ٹن تک) رہی تاہم 2010 اور 2011 کے سیلابی بارشوں کیچہ سے خیر بختو، ننواہ، سندھ اور پنجاب کے کچھ علاقوں میں کھیتوں میں زائد پانی کھڑا ہوئی کیچہ سے گندم کی کاشت بروقت نہیں ہو سکی یا کم ہوئی جس کیچہ سے ان علاقوں میں گندم کی پیداوار متاثر ہوئی۔ 2012ء میں بھی پنجاب کے کچھ علاقوں مثلاً ڈیرہ غازی خان، راجن پور، رحیم یار خان وغیرہ اور بلوچستان کے کچھ علاقوں مثلاً نصیر آباد، ڈوڈیٹن وغیرہ موسلا دھار بارشوں اور سیلابی پانی سے بُری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ حکومت اگر بروقت کھڑے پانی کے نکاس اور کسانوں کو کچ اور کھاد وغیرہ کی فراہمی مفت / کم ریٹ ملتی بنائے تو بروقت کاشت اور پیداوار میں خاطر خواہ اضافہ ممکن ہے۔

(3) گندم کی فصل کیلئے پانی کی ضرورت اور آبپاشی کا شیڈول:

جغرافیائی لحاظ سے پاکستان کے زیادہ تر زرعی میدانوں میں ربیع کے دوران بارش کی کل مقدار بارش کے دوران وقفہ گندم کی کاشت کیلئے مناسب نہیں اس لئے کہ ملک کے کثرتی میدانوں میں بارش گندم کے فصل کی ضرورت سے کم ہے۔ پاکستان میں گندم کیلئے پانی کی ضرورت (ETcrop) 271-514mm تک ہے۔ سب سے کم ملک کے شمالی علاقوں جبکہ سب سے زیادہ گرم جنوبی میدانوں کی ہے۔ اس لئے پنجاب اور خیر بختو، ننواہ کے زیادہ تر میدانی علاقوں میں 5-3 مرتبہ آبپاشی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جبکہ جنوبی گرم میدانی علاقوں میں 4-6 دفعہ ہوتی ہے۔ آبپاشی پانی کی مقدار اور تعدد کا انحصار فصل کے دوران بارش پر ہوتی ہے۔ اس طرح گندم کے پودے کو پانی کی سب سے زیادہ ضرورت سٹرنٹل سے لیکر دانہ بننے کے دوران ہوتی ہے۔ یہ بات سامنے آئی ہے کہ اگر کسان سمجھداری سے کام لے تو صرف تین دفعہ پانی دینے سے بھی اچھی پیداوار ممکن ہے۔ یعنی پہلا پانی شگوفے نکلنے (Flowering) سے پہلے ہوائی کے 20-25 دن بعد (بشرطیکہ فصل کی کاشت بروقت ہوئی ہو) دوسرا پانی کوکھڑکی حالت یعنی سٹرنٹل کے دوران یا تھوڑا پہلے (Heading) جبکہ تیسرا پانی دانہ بننے کے دوران جب دانے سے دودھ نکلے (Milk maturity) دیا جائے۔ چار دفعہ پانی دینے کی صورت میں پہلی دفعہ 20-25 دن بعد شگوفے نکلنے سے پہلے یا اس کے دوران دوسری دفعہ سٹرنٹل کے قریب تیسری دفعہ (Milk maturity) یعنی جب دانہ کچا ہو کر اس سے دودھ نکلنے اور پختگی مرتبہ (wax maturity) یعنی جب دانہ گوندنا حالت میں ہو۔ اگر دو دفعہ پانی میسر ہو تو پہلا پانی 20-25 دن بعد اور دوسرا پانی سٹرنٹل سے تھوڑا پہلے یا اس کے دوران دینا چاہیے۔

بروقت زائد جڑی بوٹیوں کی تلفی

گندم کی اچھی پیداوار کیلئے کھیت سے بروقت جڑی بوٹیوں کا خاتمہ کرنا چاہیے تاکہ پودے کو آبپاشی اور پوری طرح سورج کی روشنی، پانی اور زمین سے دوسری نمکیات اور کھاد وغیرہ ملیں۔ ایک انداز سے نمکیات فاضل جڑی بوٹیوں کی وجہ سے پیداوار میں 2-4 فیصد تک کمی واقع ہو جاتی ہے۔ فاضل جڑی بوٹیوں کے مکمل روک تھام کے لئے منظور شدہ اسپرے وغیرہ کیساتھ صاف ستھرے بیج کی کاشت بھی انتہائی ضروری ہے۔ بروقت اور مناسب وقفوں کیساتھ نسل و جن اور فاسفورس والی کھادوں کی مناسب مقدار بھی زیادہ پیداوار کیلئے ضروری ہے۔ تمام کسانوں خصوصاً باغی علاقے جہاں آبپاشی کیلئے ٹیوب ویل کا استعمال ہوتا ہے وہاں کے کسان حضرات سے گزارش ہے کہ فصلوں پر اسپرے، کمیائی کھاد کا استعمال یا فصل کاشت کرنے کے وقت محکمہ موسمیات کے موسمی مشوروں سے باخبر رہیں تاکہ کسان بغیر کسی نقصان کے کم خرچ پر زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کر سکیں۔